

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F  
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 WRégisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-MarneSUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN N° 138 de MARS 197222 Mars 1972/n° 5V I G N EAcariose :

Les traitements de prédébourrement sont les plus efficaces contre ce parasite qui bien qu'en régression doit toujours être surveillé.

Ils consistent en une pulvérisation copieuse réalisée :

- soit 20 jours avant le débourrement avec une bouillie à base d'huile d'anthracène
- soit juste avant le débourrement (stade B - bourgeons dans le coton) avec des soufres micronisés ou un oléoparathion. Ces deux derniers produits sont également actifs contre l'érinose.

GRANDE CULTUREMeligèthes sur colza d'hiver :

A la faveur de températures particulièrement élevées pour la saison des concentrations exceptionnellement précoces de méligèthes s'observent sur les colzas. Les premiers dommages sont constatés sur les tout jeunes boutons, particulièrement en bordure des pièces.

Surveiller attentivement les cultures ; la persistance d'un temps doux rendrait le traitement indispensable à bref délai.

Toutefois dans les cultures d'assez grande superficie seules les bordures (sur 20 à 25 m de largeur) seraient à protéger.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

R. PARIS

A. GODIN

Le Chef de la Circonscription  
Phytopathologique CHAMPAGNE,

J. DELATTRE.